

Działanie następcze herbicydów stosowanych w przedplonach buraka cukrowego

Aktualne i szczegółowe informacje dotyczące działania następczego herbicydów zastosowanych w przedplonie buraków cukrowych znajdziesz zawsze na etykietach ŚOR. Wszystkie etykiety dostępne są na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:



<https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin---zastosowanie>



Substancja aktywna / kombuinacja substancji aktywnych	Uprawa buraków po zastosowaniu herbicydu			Opis oznaczeń:
				Brak Danych
				Uprawa Możliwa
	Przed 2 laty	Przed rokiem		Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
	jesień	wiosna	jesień (po likwidacji uprawy)	Uwagi
izoksafłutol + tienkarbazon metylu		*		Możliwość wystąpienia uszkodzeń w przypadku stosowania uproszczeń uprawowych, zwłaszcza na glebach lekkich oraz po suszy
oksyfluorofen			*	Uprawa możliwa po orce na głębokości min. 25 cm
diflufenikan + mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
tritosulfuron				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
2,4-D			*	Uprawa możliwa po wykonaniu uprawy przedsiewnej
2,4-D + dikamba			*	Uprawa możliwa po wykonaniu uprawy przedsiewnej
mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy			*	Uprawa możliwa. Wg niemieckich zaleceń w dawce do 0,6 l/ha, powyżej tej dawki nie zaleca się siania buraków
propoksykarbazon sodu				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
karfentrazon etylu		*		Uprawa możliwa po upływie 3 miesięcy od zastosowania środka
bromoksynil + tembotrion		*		Uprawa możliwa po wykonaniu orki
aklonifen		*		Uprawa możliwa. Wg niemieckich zaleceń należy wymieszać glebę na głębokość 15 cm (pow. 3 miesięcy od aplikacji)
pikloram + haluksafen metylu - Arylex				Po 120 dniach od zabiegu można uprawiać zboża jare, kukurydze, rzepak jary, gorczycę oraz trawy
tritosulfuron + florasulam			*	Wg niemieckich zaleceń siał buraki nie wcześniej niż 60 dni po aplikacji

diflufenikan + penoksulam + florasulam				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
metazachlor + chinomerak			*	Uprawa możliwa po uprawie mieszającej glebę na min. 15 cm
dimetanamid-P + metazachlor + chinomerak				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
terbutylazyna + mezotrion		*		Możliwość wystąpienia uszkodzeń, zwłaszcza na glebach lekkich, pH<6 i glebach z subst. Org. Pow. 4%, po suszy
tembotrion + tienkarbazon metylu		*		Na glebach lekkich lub po wystąpieniu suszy zaleca się wykonanie orki i uprawki przedsiewne
dikamba + prosulfuron		*		Uprawa możliwa po orce na głębokości min. 25 cm. Nie na glebach lekkich zbitych, o niskiej aktywności mikrobiologicznej, po suszy.
metazachlor + chinomerak + imazamoks				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
dimetachlor + napropamid + chlomazon				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
chlomazon				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
napropamid + chlomazon				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
napropamid		*		Uprawa możliwa po orce na głębokość min. 20 cm po upływie 12 miesięcy od zastosowania środka
aminopyralid + florasulam		*		Po upływie 11-13 miesięcy od zastosowania środka
mezotrion + nikosulfuron		*		Uprawa możliwa po orce na głębokość min. 25 cm. Możliwość wystąpienia uszkodzeń, zwłaszcza na glebach lekkich, pH<6 i glebach z subst. Org. Pow. 4% po suszy
flufenacet + metrybuzyna				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
tifensulfuron metylowy + metsulfuron metylowy				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
bifenoks				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
chlopyralid + pikloram				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
metsulfuron metylu				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
chlorosulfuron				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana. Możliwość uprawy po 24 miesiącach od zastosowania środka, po głębokiej orce na min. 20 cm głębokości
jodosulfuron metylosodowy		*		Uprawa możliwa po orce na głębokości min. 25 cm. Wg etykiety nie stwarza zagrożenia. Wg praktyki niemieckich rolników, w przypadku suszy możliwe zahamowanie rozwoju
nikosulfuron		*		Może wystąpić zahamowanie rozwoju
metazachlor + chlomazon				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
diflufenikan + flufenacet				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana

aminopyralid potasowy + piroksysulam + florasulam		*		Uprawa możliwa po upływie min. 11 miesięcy od zabiegu, słoma musi być wymieszana
diflufenikan				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
chlorotoluron + diflufenikan	*			Uprawa możliwa po zabiegu mieszającym glebę na głębokości min. 10 cm
flupyrsulfuron metylowy				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
metolachlor-S + terbutyloazyna + mezotrion		*		wg etykiety możliwość wystąpienia uszkodzeń, zwłaszcza na glebach lekkich, pH<6 i glebach z subst. Org. Pow. 4%, po suszy
foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy		*		Uprawa możliwa jeżeli po zabiegu były normalne warunki wegetacji
2,4-D + aminopyralid + florasulam		*		Uprawa możliwa 11-13 miesięcy od zastosowania środka
chlopyralid + pikloram + aminopyralid			*	Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana. Możliwość uprawy po 18 miesiącach od zastosowania środka
petoksamid + chlomazon				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
chlorotoluron			*	Wg zaleceń niemieckich nie zaleca się siewu buraków
flurochloridon				Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana
aminopyralid	*	*		Uprawa nie jest możliwa/nie jest zalecana. Możliwość uprawy po 18 miesiącach od zastosowania środka
metrybuzyna		*		Wg praktyki niemieckich rolników, uprawa możliwa po orce na głębokość min. 20 cm
dimetachlor			*	Uprawa możliwa po zabiegu mieszającym glebę na głębokości min. 15 cm
pendimetalina + chlorotoluron + diflufenikan	*		**	* Uprawa możliwa po zabiegu mieszającym glebę na głębokości min. 10 cm / ** uprawa możliwa po orce na głębokość min. 20 cm
propyzamid			*	Uprawa możliwa po upływie 6 miesięcy od zastosowania środka, po zabiegu mieszającym glebę